

日本腎臓病薬物療法学会誌 特別号 2016 腎機能別薬剤投与方法一覧 P.246 訂正事項

日本腎臓病薬物療法学会誌 特別号(2016年3月21日発行)におきまして、以下の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

2016年6月8日 腎機能別薬剤投与方法一覧作成委員会, 学会誌編集委員会

<1> オセルタミビルリン酸塩

| 訂正前 | 分類 | 重要度 | 薬剤名 | | | 透析性 | 禁忌 | 腎障害 | 常用量 | | | | GFRまたはCCr(mL/min) | | | | HD(血液透析) PD(腹膜透析) |
|------------|----|-------------|------|------------------|-----|-----|----|----------------------------|-----------|----|----|--|-------------------|----|----|-------------------------|----------------------|
| | | | 一般名 | 番号 | 商品名 | | | | >80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10> | |
| | | | | | | | | | 正常または軽度低下 | | | | 軽度～高度低下 | | | | |
| インフルエンザ治療薬 | ◎ | オセルタミビルリン酸塩 | 1120 | タミフルカプセル | ○ | | ○ | 150 mg 分2 | | | | CCr ≤ 30 mL/minで75mg 分1 | | | | CCr ≤ 30 mL/minで75mg 分1 | |
| | | | 1121 | タミフルカプセル・ドライシロップ | ○ | | ○ | 治療: 150 mg 分2、予防: 75 mg 分1 | | | | 治療では1回75 mgを単回投与(以後投与しない)、 予防: 1回75 mgを確実投与 | | | | | |



| 訂正後 | 分類 | 重要度 | 薬剤名 | | | 透析性 | 禁忌 | 腎障害 | 常用量 | | | | GFRまたはCCr(mL/min) | | | | HD(血液透析) PD(腹膜透析) |
|------------|----|-------------|------|------------------|-----|-----|----|--|-----------|----|----|---|-------------------|----|----|--|----------------------|
| | | | 一般名 | 番号 | 商品名 | | | | >80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10> | |
| | | | | | | | | | 正常または軽度低下 | | | | 軽度～高度低下 | | | | |
| インフルエンザ治療薬 | ◎ | オセルタミビルリン酸塩 | 1121 | タミフルカプセル・ドライシロップ | ○ | | ○ | 治療: 150 mg 分2×5日間 予防: 75 mg 分1×7～10日間 | | | | 治療: 1回75 mgを1日1回×5日間 予防: 1回75 mgを隔日投与×4～5回 | | | | ※推奨用量は確立されていないが、以下の用量が提案されている。 治療: 1回75 mgを単回投与 予防(HD): 初回75mg, その後2回のHDを実施後(HD後)に75mg(計2回) 予防(PD, ESRD): 初回75mg, 7日目に75mg追加(計2回) | |

<2> アデホビルピボキシル

| 訂正前 | 分類 | 重要度 | 薬剤名 | | | 透析性 | 禁忌 | 腎障害 | 常用量 | | | | GFRまたはCCr(mL/min) | | | | HD(血液透析) PD(腹膜透析) |
|---------|----|------------|------|-------|-----|-----|----|-----------|-----------|----|----|--------------|-------------------|----|----|---------------------|----------------------|
| | | | 一般名 | 番号 | 商品名 | | | | >80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10> | |
| | | | | | | | | | 正常または軽度低下 | | | | 軽度～高度低下 | | | | |
| B型肝炎治療薬 | ◎ | アデホビルピボキシル | 1125 | ヘプセラ錠 | ○ | | | 10mgを1日1回 | | | | 10mgを2～3日に1回 | | | | 10mgを週1回、HD患者ではHD後に | |



| 訂正後 | 分類 | 重要度 | 薬剤名 | | | 透析性 | 禁忌 | 腎障害 | 常用量 | | | | GFRまたはCCr(mL/min) | | | | HD(血液透析) PD(腹膜透析) |
|---------|----|------------|------|-------|-----|-----|----|----------|-----------|----|----|--------------|-------------------|----|----|------------------------|----------------------|
| | | | 一般名 | 番号 | 商品名 | | | | >80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10> | |
| | | | | | | | | | 正常または軽度低下 | | | | 軽度～高度低下 | | | | |
| B型肝炎治療薬 | ◎ | アデホビルピボキシル | 1125 | ヘプセラ錠 | ○ | | | 1日1回10mg | | | | 1回10mgを2日に1回 | | | | 1回10mgを週1回, HD患者ではHD後に | |